

Hiperplasia benigna de próstata

Síntomas, complicaciones y calidad de vida

medifichas



Es una patología común

Afecta al

50%

de los hombres
>50 años¹.



Es una de las principales causas de síntomas del tracto urinario inferior en los hombres²

Síntomas obstructivos:

- Dificultad para comenzar a orinar
- Chorro miccional débil o intermitente
- Goteo posmiccional
- Vaciamiento incompleto

Síntomas irritativos:

- Polaquiuria
- Urgencia miccional
- Nicturia
- Incontinencia de urgencia



Puede desencadenar complicaciones¹

- Progresión de los síntomas (17-40%)
- Retención urinaria (1-2% al año)
- Infecciones del tracto urinario (0,1-12%)
- Cálculos renales (0,3-3,4%)
- Insuficiencia renal (<2,5%)
- Hematuria



Reduce la calidad de vida¹



Los síntomas interfieren con las actividades diarias de los pacientes y tienen un impacto negativo en su calidad de vida.

descárgate más medifichas en www.almirallmed.es

1. Chughtai B, Forde JC, Thomas DD, Laor L, Hossack T, Woo HH, et al. Benign prostatic hyperplasia. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16031.

2. Scher HI, Eastham JA. Benign and malignant diseases of the prostate. En: Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J, editores. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20.ª ed. Estados Unidos: McGraw-Hill Education; 2018. p. 623-32.